

Prova "B"

1. L'aumento del contenuto idrico del polmone per formazione di trasudato che imbibisce l'interstizio o gli alveoli è detto:
 - a. Edema polmonare
 - b. Collasso polmonare
 - c. Congestione polmonare
 - d. Asma bronchiale
2. Le infezioni delle vie urinarie possono distinguersi in:
 - a. Acute
 - b. Ricorrenti
 - c. Croniche
 - d. Tutte le precedenti
3. Cosa si intende per wandering:
 - a. Un lavaggio in cui la biancheria piana viene sanificata
 - b. Fenomeno comune negli anziani affetti da demenza che consiste in una pulsione verso il vagare
 - c. Fenomeno comune negli anziani affetti da demenza che consiste in una tendenza a rimanere immobili
 - d. Un metodo di disinfezione delle superfici
4. Quale tra le seguenti è una scala di valutazione per il rischio delle cadute:
 - a. Scala Tinetti
 - b. Scala Conley
 - c. Scala Morse
 - d. Tutte le precedenti
5. Cosa si intende per PAI:
 - a. Piano Assistenziale Individualizzato
 - b. Progetto Accoglienza e Integrazione
 - c. Piano Autovalutazione Infermieristica
 - d. Progetto Affiancamento Infermieristico

6. Emocultura consiste nel prelievo di un campione di sangue tramite venipuntura allo scopo di valutare:
 - a. La presenza di batteri o miceti nel torrente circolatorio
 - b. I livelli di ossigenazione nel sangue
 - c. I livelli di emoglobina nel sangue
 - d. I livelli di glucosio nel sangue
7. Quali sono i rischi di un paziente in terapia con anticoagulanti orali (TAO):
 - a. Emorragie
 - b. Stipsi
 - c. Dolore addominale
 - d. Cadute
8. Cosa si intende per pandemia:
 - a. Il succedersi continuo e costante di un numero limitati di casi in un certo territorio
 - b. Una epidemia con tendenza a diffondersi ovunque
 - c. La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un'area limitata in un breve periodo di tempo
 - d. Una malattia incurabile
9. Cosa intende per PICC:
 - a. Catetere venoso centrale ad inserzione periferica
 - b. Catetere venoso periferico ad inserzione centrale
 - c. Una marca di siringhe
 - d. catetere venoso periferico ad inserzione periferica
10. L'ictus:
 - a. Insorge in maniera improvvisa
 - b. E' cronico degenerativo
 - c. E' tipico dell'età pediatrica
 - d. E' una sindrome perinatale
11. Secondo la DGR 514/2009 e ss.mm.ii il PAI deve includere:
 - a. L'individuazione degli obiettivi specifici dell'intervento sull'utente
 - b. L'individuazione degli obiettivi specifici sul Caregiver
 - c. Gli strumenti utilizzati per il passaggio delle informazioni tra gli operatori che eseguono il medesimo utente
 - d. Tutte le precedenti

12. La manovra di Heimlich è:

- a. Una tecnica utilizzata prima della somministrazione di farmaci
- b. Una tecnica utilizzata prima di un prelievo in arteria radiale
- c. Una tecnica di primo soccorso
- d. Una scala di valutazione della deglutizione

13. Che cos'è il BLSD:

- a. Un intervento di primo soccorso senza l'impiego di defibrillatore semiautomatico
- b. Un intervento di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore semiautomatico
- c. Un'insieme di sintomi psichiatrici e disturbi comportamentali, comuni a tutti i tipi di demenza
- d. Un'insieme di esercizi fisioterapici per la riabilitazione motoria

14. La concentrazione di ossigeno in area ambiente:

- a. 21%
- b. 100%
- c. 90%
- d. 1%

15. Che cosa misura la scala di Bristol:

- a. Deterioramento cognitivo
- b. Grado di difficoltà della minzione
- c. Consistenza delle feci
- d. Grado delle lesioni da pressione

16. Con il termine stranguria si intende:

- a. Emissione di urina dolorosa intermittente
- b. Emissione di feci diarroiche
- c. Emesi frequenti
- d. Emissione di sangue dal naso

17. La scala di VAS è indicata per la valutazione del dolore:

- a. Nel paziente incosciente
- b. Nel paziente demente
- c. Soggettivo esperito dal paziente
- d. Nessuna delle precedenti

18. In un paziente in posizione supina quali sono le sedi a maggior rischio di insorgenza di lesioni da pressione:

- a. Sacro
- b. Ginocchio
- c. Clavicole
- d. Fronte

19. Quale tra le seguenti aritmie non è mortale:

- a. Fibrillazione ventricolare
- b. Asistolia
- c. Fibrillazione atriale cronica
- d. Tachicardia ventricolare senza polso

20. Il diabete è una malattia:

- a. Ortopedica
- b. Cerebrale
- c. Metabolica
- d. Cardiaca

21. Individua la corrispondenza esatta:

- a. Otite – malattia dell'orecchio
- b. Colon - Pericardio
- c. Cardias - Cuore
- d. Occhio - Fegato

22. Quando si effettua il lavaggio sociale delle mani:

- a. Dopo procedure pulite non invasive
- b. Prima di procedure pulite e non invasive
- c. Prima e dopo aver indossato i guanti
- d. Tutte le precedenti

23. Quali tra i seguenti farmaci è un antipsicotico:

- a. Furosemide
- b. Risperidone
- c. Enoxoparina
- d. Paracetamolo

24. L'osteoporosi :

- a. Facilita la frattura del femore
- b. Facilita l'evacuazione
- c. Facilita la frattura delle ossa nasali
- d. Tutte le precedenti

25. 47. Ai sensi del D.P.R. 62/2013 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai fini dell'art.4, qual è la cifra orientativa stabilita per regali o altre utilità di modico valore:

- a. 1€
- b. 1000€
- c. 150€
- d. 10'000€

26. Tra i segni della disidratazione è possibile notare:

- a. Secchezza della bocca e diminuzione della frequenza della minzione
- b. Arrossamento della pelle e ingrossamento delle dita
- c. Sudorazione profusa e pelle seborroica
- d. Lacrimazione abbondante e scialorrea

27. La poliuria è:

- a. Condizione in cui vengono prodotte abbondanti quantità di urine
- b. Condizione in cui vengono prodotte una normale quantità di urine
- c. Condizione in cui non viene prodotta urina
- d. Condizione in cui è difficile contenere l'urina

28. Quale condotta deve tenere l'infermiere nei confronti di un paziente in cui si sospetti una crisi ipoglicemica:

- a. Somministrare glucosio e chiamare un medico
- b. Somministrare glucosio, controllare la glicemia e chiamare un medico
- c. Controllare la glicemia, somministrare glucosio e chiamare un medico
- d. Chiamare medico e non fare nulla fino al suo arrivo

29. Quali sono i sintomi dell'ipoglicemia:

- a. Sudorazione, tremore, confusione mentale, capogiro
- b. Secchezza delle fauci
- c. Iperattività
- d. Gonfiore agli arti inferiori

30. Per T.S.O. si intende:

- a. Trattamento Sociale Organizzato
- b. Terapia Sociale Olistica
- c. Trattamento Sanitario Ostetrico
- d. Trattamento Sanitario Obbligatorio