

CAMPAGNA VACCINALE 2025

CITTADINI CHE POSSONO USUFRUIRE DELLE VACCINAZIONI

Vaccino antiinfluenzale:

il vaccino è offerto gratuitamente a tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

Si raccomanda di aderire alla campagna vaccinale ai soggetti appartenenti alle categorie a rischio:

- età maggiore di 60 anni
- donne in gravidanza o allattamento
- personale sanitario
- caregiver
- cittadini a rischio per patologia indipendentemente dall'età (malattie croniche apparato respiratorio, malattie cardio-circolatorie, malattie cerebrovascolari, diabete, malattie neurologiche, obesità, insufficienza renale cronica, malattie degli organi emopoietici, patologia oncologica, trapianto d'organo e immunodepressione, immunodeficienza primitive, HIV, malattie croniche intestinali, sindrome di down, epatopatie gravi, disabilità gravi)

VACCINO ANTI PNEUMOCOCCO:

la vaccinazione sarà proposta dal medico durante la vaccinazione antinfluenzale ai:

- cittadini che compiono 65 anni nel 2025
- cittadini con più di 65 anni che non si siano mai vaccinati
- soggetti a rischio per patologia: cardiopatia cronica, diabete, epatopatie croniche, insufficienza renale cronica

può essere fatto il richiamo dopo almeno 5 anni dalla precedente vaccinazione

VACCINO ANTI COVID:

- la vaccinazione è offerta gratuitamente a tutta la popolazione sopra i 12 anni e consigliata alle persone con più di 60 anni o appartenenti alle categorie a rischio
- il vaccino disponibile è solamente Comirnaty (pfizer) aggiornato alle ultime varianti
- la vaccinazione ha copertura annuale

VACCINO ANTI ZOSTER:

- la vaccinazione è offerta gratuitamente:
- ai cittadini sopra i 50 anni appartenenti a categorie a rischio per patologia: diabete, patologie cardiovascolari esclusa l'ipertensione isolata, patologie respiratorie croniche, soggetti con immunodeficienza congenita o acquisita, insufficienza renale cronica
- cittadini sopra ai 18 anni con recidive di Herpes Zoster oppure forme particolarmente gravi.

La vaccinazione prevede un richiamo che verrà somministrato tra i 2 e i 6 mesi di distanza.