

PROVA “C”

1. Cosa misura la scala di Barthel?
 - a. Le prestazioni di un soggetto nelle attività della vita quotidiana
 - b. Il rischio di sviluppare lesioni da pressione
 - c. Il rischio cadute

2. I sintomi dell'ipoglicemia sono:
 - a. Sudorazione, tremore, confusione mentale, capogiro
 - b. Secchezza delle fauci, poliuria
 - c. Edemi declivi, pallore, rialzo termico

3. Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, chi è l'RSPP?
 - a. Il Referente per la Sicurezza e il Piano di Protezione
 - b. Il Revisore dei Servizi di Protezione Periodica
 - c. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

4. Quale scala si utilizza per la rilevazione del dolore in un paziente con demenza?
 - a. PAINAD
 - b. Norton
 - c. NRS

5. Con il termine stranguria si intende:
 - a. Emesi frequenti
 - b. Emissione di sangue dal naso
 - c. Emissione di urina dolorosa intermittente

6. Il placebo è:
 - a. Un farmaco per la crescita dei capelli
 - b. Una sostanza inerte o comunque priva dell'effetto farmacologico atteso
 - c. L'utilizzo di animali domestici con persone affette da disabilità

7. Il termine microclima indica:
 - a. Temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione di una stanza
 - b. Un moderno impianto di condizionamento dalle dimensioni molto contenute
 - c. Temperatura e aspetto di una stanza

8. Che cosa si intende per BPSD:
 - a. Disturbo post traumatico da stress
 - b. Insieme eterogeneo di reazioni psicologiche e disturbi comportamentali comuni a tutti i tipi di demenza
 - c. Tecnica di primo soccorso

9. Quali tra i seguenti principi attivi è costituente dei farmaci ipoglicemizzanti orali:
 - a. Sulfamidico
 - b. Acido acetilsalicilico
 - c. Metformina

10. Quale parte del corpo è interessata dall'emiplegia:
 - a. Tutti e quattro di arti
 - b. Tutta la parte emilaterale
 - c. Entrambi gli arti inferiori

11. L'attacco ischemico transitorio (TIA):
 - a. È un episodio di deficit neurologico di durata inferiore alle 24 ore
 - b. Ha come causa principale un'emorragia subaracnoidea
 - c. Non presenta alterazioni della coscienza

12. Nelle manovre di primo soccorso, qual è la sequenza della valutazione del soggetto incosciente?
 - a. Circolazione – coscienza- respiro – traumi del rachide
 - b. Vie aeree – respirazione – circolazione- coscienza
 - c. Coscienza – vie aeree – respirazione – circolazione

13. L'angina pectoris è:

- a. Una sintomatologia dolorosa causata dal ridotto apporto di sangue all'area del miocardio irrorata dall'arteria compromessa
- b. Una sintomatologia dolorosa legata alle principali arterie degli arti inferiori che si manifesta dopo uno sforzo muscolare
- c. Un'area di necrosi contenenti detriti cellulari e sali di calcio

14. Nella somministrazione di un farmaco tramite peg è necessario:

- a. Sospendere l'infusione almeno un'ora prima della somministrazione della terapia
- b. Mettere il farmaco all'interno della sacca d'alimentazione
- c. Lavare il sondino prima e dopo la somministrazione con acqua

15. Tra le raccomandazioni generali nella gestione del catetere vescicale è importante:

- a. Posizionare il catetere sempre più in alto della vescica
- b. Effettuare frequenti indagini diagnostiche su campioni di urina prelevati dalla sacca di raccolta
- c. Non sraccordare mai il circuito

16. Si definisce cachessia:

- a. Stato morboso caratterizzato da estrema magrezza, riduzione delle masse muscolari e assottigliamento della cute
- b. L'eccessivo aumento ponderale caratterizzato da notevole presenza di tessuto adiposo
- c. Il dimagrimento di un individuo dovuto esclusivamente ad inappetenza

17. Che cos'è l'afasia?

- a. Incapacità di deambulare in modo autonomo
- b. Incapacità di nutrirsi autonomamente
- c. Incapacità di esprimersi mediante la parola o la scrittura o di comprendere il significato delle parole dette o scritte da altri

18. In quali casi gli aghi e gli altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo precauzioni atte ad evitare punture e tagli accidentali?
- a. Solo in Pronto Soccorso
 - b. Sempre, indipendentemente dalla natura del paziente sul quale sono stati impiegati
 - c. Solo quando utilizzati per pazienti HIV o HCV positivi
19. Quale tra le seguenti è la corretta definizione di “dispnea”?
- a. Difficoltà respiratoria che può essere temporanea o cronica
 - b. Difficoltà a deglutire
 - c. Difficoltà a tossire
20. Per T.S.O. si intende:
- a. Trattamento Sociale Organizzato
 - b. Trattamento Sanitario Obbligatorio
 - c. Trattamento Sanitario Ostetrico
21. Sulla base del D. Lgs. 81/2008 sul luogo di lavoro l’infermiere deve:
- a. Occuparsi esclusivamente della salute e sicurezza degli utenti, conformemente alla sua formazione e al ruolo professionale ricoperto
 - b. Occuparsi esclusivamente delle emergenze di tipo sanitario, utilizzando i mezzi a disposizione
 - c. Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
22. Per melena si intende:
- a. Emissione di feci con una colorazione molto chiara
 - b. Presenza di sangue digerito nelle feci, le quali assumono una colorazione molto scura
 - c. Presenza di sangue rosso vivo nelle feci

23. Con il termine ittero si intende l'aumento della concentrazione di:
- a. Bilirubina nel sangue, al quale consegue la colorazione giallastra delle sclere e/o dell'intera superficie cutanea
 - b. Ammonio nel sangue, al quale consegue un caratteristico stato di agitazione psicomotoria
 - c. Urea nel sangue, al quale consegue come caratteristico sintomo osservabile il prurito
24. L'aspirazione endotracheale:
- a. Deve durare almeno 25-30 secondi per assicurare la rimozione delle secrezioni
 - b. Non deve avere durata inferiore a 20 secondi
 - c. Non deve durare più di 10-15 secondi per non provocare effetti collaterali
25. La posizione di Fowler consente:
- a. La rimozione di corpi estranei dalla laringe
 - b. Una migliore funzionalità ventilatoria
 - c. L'esplorazione della prostata
26. Indicare un valore di glicemia a digiuno considerato nei range di normalità:
- a. 90 g/dl
 - b. 5,5 mmol/l
 - c. 70 – 105 mg/dl
27. Il plasma è:
- a. La parte liquida del sangue
 - b. La parte corpuscolata del sangue
 - c. Sinonimo di linfa
28. Il Codice Deontologico è:
- a. Uno strumento di orientamento contrattuale
 - b. Uno strumento che regola i comportamenti degli Operatori Sanitari
 - c. Uno strumento di salvaguardia della salute

29. Quale tra i seguenti provvedimenti riveste maggior importanza nella prevenzione delle infezioni?

- a. L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti
- b. La nebulizzazione
- c. Il lavaggio delle mani

30. Quale fra questi test di screening risulta utile per valutare la funzione cognitiva dell'anziano?

- a. Tyne Test
- b. Mini Mental State Examination
- c. Glasgow Coma Scale