

TUTTE LE INDICAZIONI SUI PRINCIPI ATTIVI, AVVERSAITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE E' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSAITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

Rischio

OIDIO (MAL BIANCO)

2

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

OPPURE **SPIROXAMINA (3T/MAX)** (consigliati due trattamenti di seguito a dosaggio in aumento, come da etichetta)

O IN FINE 2 MEPTILDINOCAP(2MAX) !!! ULTIMO ANNO DI IMPIEGO !!!

Q IN FINE

SE NON GIÀ IN FORMULAZIONE AGGIUNGERE ZOLFO A BASSI DOSAGGI PREFERIBILMENTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA CON MAGGIOR RESISTENZA AL DILAVAMENTO (ATTENZIONE CON DITHIANON)

VALUTARE ANCHE ALTERNANZA/COMPLEMENTO CON LE S.A/AG. ATT. MICRO/BIOLOGICHE. I QUALI CEREVISANE, COS-OGA, LAMINARINA E ED ALTRE

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI