

10

16 lug 26

SITUAZIONE

La prima metà del mese di luglio si è chiusa con scarsi apporti di pioggia (ampiamente sotto i 10 mm) e con un evento grandinigeno in apertura che ha interessato il confine sud orientale tra Ghemme e Sizzano, con danni anche importanti nel centro più attivo del nucleo temporalesco. Siamo nel pieno della terza ondata di calore dell'anno che dovrebbe finalmente concludersi nel weekend. Non esclusi ulteriori apporti temporaleschi tra domani e martedì con ripresa conseguente (inutile ma da considerare) di bagnature fogliari. L'invasitura si è presentata con segnali di esordio record in zone/viti particolarmente sofferenti ma ora pare in stasi come evidenza di necessità idrica per proseguire

PERONOSPORA ED OIDIO

RISCHIO

Rischio resta molto basso per entrambi i patogeni salvo necessità di tutela parete vegetativa da ripresa attacchi legata ad aumento umidità/calore temperature da settimana prossima

Su erbaluce si consiglia di effettuare l'ultimo trattamento. Si ricorda che il grado di sensibilità delle bacche agli attacchi all'odio è calante al procedere/ e si conclude al compimento dell'invaitura (resistenza ontogenetica). Per cui nel prossimo trattamento escludere zolfo anche su rossi precoci

Si consiglia: **TRA SABATO 18 E LUNEDÌ 20** RINNOVARE la copertura

Fare fare ricorso a f.c. contenenti Zolfo in formulazione bagnabile o bicarbonato di potassio, p.a. quest'ultimo che può esplicare, nelle condizioni che si prospettano, un'attività preventiva generale antifungina.

In aggiunta, in copertura antiparassitaria ricorre a formulati rameici a maggior persistenza ai dosaggi minimi di etichetta. Si rammenta che sono considerati già ampiamente efficaci a tutti gli effetti di difesa apporti di rame metallo ad ettaro di 200 grammi. Pertanto un prodotto che contiene il 25% di rame, salvo indicazioni di etichetta, può essere utilizzato tranquillamente a dosaggi di 1 kg/ha.

Utilissimo in questo contesto l'eventuale ricorso a formulati (micro) biologici già elencati nei precedenti bollettini tanto più se multi-target

ALTRI CONSIGLI

ATTENZIONE ALLA GESTIONE DELLE SFOGLIATURE. L'ANNATA PRESENTA TUTTE LE CARATTERISTICHE AFFINCHÉ SI MANIFESTINO STRESS IDRICI E TERMICI SU GRAPPOLI, TANTO PIÙ SE TROPPO ESPOSTI. SI SONO GIÀ MANIFESTATI DANNI A PARTIRE DAL 15 GIUGNO CON I PRIMI INNALZAMENTI DELLE T SOPRA I 35°C

INTERROMPERE ASSOLUTAMENTE LA SFOGLIATURA IN QUESTA FASE DI PRE INVAIATURA

TRINCIATURA DEL COTICO ERBOSO: REGOLARE CORETTAMENTE LA BARRA PER NON ESEGUIRE TAGLI TROPPO A RASO. SI RICORDA OBBLIGO DI SFALCIO A FILARI ALTERNI (SALVO AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI) INSETTICIDI COME DI SEGUITO SPECIFICATO

SECONDO. INSETTICIDA OBBLIGATORIO PER FLAVESCENTZA DORATA/POPILLIA JAPONICA . ATTENZIONE SINTOMI LAMPANTI DI FLAVESCENTZA IN AUMENTO!!

RIVEDERE DATE/PRODOTTI INDICATI IN 2ª PAG. APPOSITO BOLLETTINO PRECEDENTE NR 9. **ATTENZIONE** P. PIETROIDI GENERT.TE INCOMPATIBILI CON RAMEICI

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI PRINCIPALI ATTIVI, AVVERSAI VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. E' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA VERIFICARE LE INFORMAZIONI RICEVUTE, IN PARTICOLARE PER LE AZIONI, PER IL RENDIMENTO E IL VALORE INTRINSECO. UN PARTICOLARE PER LA TERMOLOGIA: VITICOLTORE, AVVERSAI, TARGET E REFINE NORME D'IGIENE E QUALITÀ ASSICURATE.